


FICHA TÉCNICA | ARBEQUINA



DENOMINACIÓN

La Arbequina recibe esta denominación por su zona de origen, probablemente cercana al pueblo leridano de Arbeca.

OTRAS DENOMINACIONES

Arbequí, Arbequín y Blancal.

ÁREA DE CULTIVO

Es la variedad más importante de Cataluña, donde ocupa más de 55.000 hectáreas. También se ha difundido en el resto de España, sobretodo en Andalucía. Es la variedad de referencia en las nuevas plantaciones superintensivas, por este motivo además de España se ha plantado en muchos otros países; Francia, USA, Chile, Portugal, Italia, Túnez, Marruecos, Australia, Argentina.

CONSIDERACIONES AGRONÓMICAS

De vigor reducido, porte abierto y densidad de copa media-alta. Es considerada autofértil. Precoz entrada en producción y productividad elevada y constante. El rendimiento graso es elevado y la calidad de su aceite excelente, aunque presenta baja estabilidad. Posee una capacidad de enraizamiento elevada.

RESISTENCIAS, TOLERANCIAS, Y SUSCEPTIBILIDADES

Tuberculosis: Susceptible

Repilo: Medianamente tolerante

Verticilosis: Susceptible

Limitaciones: Clorosis férrica en terrenos muy calizos

Otras: Resistente al frío

CARACTERES MORFOLÓGICOS

Hoja: De color negro en la maduración. Tamaño pequeño, con la forma esférica y simétrica. El ápice es redondeado y no presenta pezón. La sección transversal máxima es circular y esta ligeramente desplazada hacia la base. Relación pulpa / hueso media.

Fruto: Forma ovoidal y simétrica. Superficie rugosa, con siete a diez surcos fibrovasculares agrupados junto a la sutura. La base y el ápice son redondeados. Este último presenta mucrón. La selección transversal máxima es circular y está centrada.

Hueso: Forma ovoidal y simétrica. Superficie rugosa, con siete a diez surcos fibrovasculares agrupados junto a la sutura. La base y el ápice son redondeados. Este último presenta mucrón. La selección transversal máxima es circular y está centrada.