

FICHA TÉCNICA | CORNICABRA



DENOMINACIÓN

Cornicabra recibe esta denominación por la forma curvada de sus frutos.

OTRAS DENOMINACIONES

Cornal, Cornatillo y Cuernecillo.

ÁREA DE CULTIVO

Es la segunda variedad española en cuanto a superficie cultivada. Se cultiva fundamentalmente en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Madrid, aunque también puede encontrarse en las provincias de Cáceres y Badajoz.

CONSIDERACIONES AGRONÓMICAS

Variedad vigorosa, de fácil enraizamiento y elevada adaptación a suelos pobres y zonas frías. Su época de floración es tardía y, aunque suele tener elevado aborto ovárico, asegura un cuajado suficiente en autopolinización. La maduración de sus frutos es tardía y estos presentan una elevada resistencia al desprendimiento que dificulta su recolección mecanizada. Su precocidad de entrada en producción es tardía y su producción se puede considerar elevada y vecera. El rendimiento graso suele ser elevado y su aceite es muy apreciado por sus características organolépticas y alta estabilidad. También es apreciada para aderezo por la calidad de su pulpa.

RESISTENCIAS, TOLERANCIAS, Y SUSCEPTIBILIDADES

Tuberculosis: Muy susceptible

Repilo: Poco resistente

Verticilosis: Susceptible

CARACTERES MORFOLÓGICOS

Hoja: Pequeña, corta y estrecha

Fruto: Eliptico y asimétrico de gran calibre.

Hueso: Alargado y asimétrico.